

A holtfához kötődő veszélyeztetett gomba- és mohafajok előfordulásai az Északi-középhegységben

dr. Papp Viktor, Kutszegi Gergely, dr. Szűcs Péter,
Németh Csaba & dr. Ódor Péter



Natura 2000 hálózat erdeinek holtfa viszonyai és monitorozása
Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/4/8)



*Trametes
gibbosa*

*Trametes
betulina*

*Trametes
hirsuta*







Pogány-rózsás ER (Börzsöny)



Antrodiella cf. *pallescens*





Auriporia aurulenta



Datronia mollis
(Hanyattfekvő tapló)



Datronia stereoides



10 mm

Dicranum viride
(Zöld seprőmoha)

VÉDETT!

Fotó: Michael Lüth

Anacamptodon splachnoides
(Ernyőmohaszerű görbefogúmoha)

VÉDETT!



Fotó: Németh Cs.



Fotó: Németh Cs.

Anacamptodon splachnoides Ernyőmohaszerű görbefogúmoha

- *Quercus cerris* nedves dendrotelmáiban fordul csak elő, talajközelen
- kizárólag 1979 előtti adatait ismertük az Északi-középhegység területéről

<http://kitaibelia.unideb.hu/>

ISSN 2064-4507 (Online) • ISSN 1219-9672 (Print)

© 2015, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary

20 (2): 202–205.; 2015

DOI: 10.17542/kat.20.202



A veszélyeztetett *Anacamptodon splachnoides* (Froel. ex Brid.) Brid. új adata a Bükk-hegységből

Szűcs Péter^{1*}, József Júlia², Papp Viktor Gábor³ & Kutszegi Gergely⁴

(1) Eszterházy Károly Főiskola TTK Biológiai Intézet, Növénytan és Ökológiai Tanszék;
H-3300 Eger, Leányka utca 6.; *szucs.peter@ekt.f.hu

(2) Szent István Egyetem, H-2100, Gödöllő, Páter Károly utca 1.

(3) Bükk Nemzeti Park Igazgatóság, H-3304 Eger, Sánc u. 6.

(4) Magyar Tudományos Akadémia ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, H-2163, Vácrátót, Alkotmány utca 2–4.

DOI: 10.17110/StudBot.2015.46.1.61

Studia bot. hung. 46(1), pp. 61–75, 2015

ANACAMPTODON SPLACHNOIDES (AMBLYSTEGIACEAE): HUNGARIAN POPULATIONS OF A MOSS SPECIES WITH A PECULIAR HABITAT

Csaba NÉMETH^{1*} and Peter ERZBERGER²

¹Department of Botany and Soroksár Botanical Garden, Faculty of Horticultural Science, Corvinus University of Budapest, H-1118 Budapest, Villányi út 29–43, Hungary; *nemetscsaba@gmail.com

²Belziger Str. 37, D-10823 Berlin, Germany



Fotó: Németh Cs.



Inonotus nidus-pici – Kétalakú csertapló




Ganoderma cupreolaccatum
(Rézvörös lakkostapló)

VÉDETT!



Ulmus glabra, Kékes ER






Forrás: Kutszegi G. és Papp V. (2016): Erdőgazdálkodási javaslatok a nagygombák funkcionális és faji sokféleségének megőrzésére. In: Korda M. (szerk.): Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére: Tanulmánygyűjtemény, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest , pp 33–56.

Xylobolus frustulatus
(mozaik réteggomba)





*Xylobolus
frustulatus*

*Hymenochaete
rubiginosa*
(Rozsdás
sörtésréteggomba)











Köszönöm a figyelmet!

